

Notice Médicale



AroFoitra®

Chlorhexidine digluconate

Forme et présentation : gel, tube de 3g. sous boîte en carton

Composition pour un tube de 3g :

Solution de Chlorhexidine digluconate 7,1% exprimée en chlorhexidine 4% w/w
.....g

Excipients : Gomme de guar, Glycerine, Benzalkonium Chloride 50% solution, Triethanolamine, Arôme Rose, eau purifiée q.s.p

Propriétés :

La Chlorhexidine digluconate agit sur un large spectre de bactéries et germes Gram positif et Gram négatif . Elle a une action bactéricide ou bactériostatique en altérant les protéines des membranes bactériennes. Elle possède un effet rémanent supérieur aux autres antiseptiques.

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un antiseptique. Il est préconisé pour désinfecter les plaies et brûlures et pour nettoyer le cordon ombilical pour les nouveaux-nés.

Posologie, mode et voie d'administration :

- *Posologie* : laver soigneusement les mains avant d'appliquer tout le contenu du tube sur le cordon ombilical immédiatement après la naissance (après avoir coupé le cordon ombilical).

Laver les mains après utilisation.

- *Mode d'administration* : application locale

- *Voie d'administration* : voie cutanée

Contre-indications :

Ne pas utiliser dans les cavités corporelles ou comme suppositoire.

La Chlorhexidine digluconate est contreindiqué chez les patients ayant montré une réaction d'hypersensibilité à la Chlorhexidine. Toutefois, ces réactions sont extrêmement rares.

Précautions d'emploi et mises en garde :

Eviter tout contact avec les yeux, le cerveau, les méninges et l'oreille moyenne. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau. Pour usage externe seulement.

Interactions avec d'autres médicaments :

Eviter l'emploi simultané ou successif avec d'autres antiseptiques

Utilisation en cas de grossesse et d'allaitement :

Il n'y a aucune contre-indication sur l'usage de ce produit durant la grossesse ou durant l'allaitement

Effets indésirables :

Réaction d'hypersensibilité aux préparations à base de chlorhexidine.

Risques d'allergie locale mais ces cas sont extrêmement rares.

Conduite à tenir en cas de surdosage :

La Chlorhexidine est faiblement absorbée en cas d'ingestion orale. Ne pas induire de vomissements. Faire un lavage gastrique avec du lait, blanc d'œufs, gélatine ou du savon doux et employer les mesures d'accompagnements adéquates.

Incompatibilités :

La Chlorhexidine est incompatible avec les agents anioniques. Les agents blanchissants à base d'hypochlorite peuvent causer des taches brunes sur les textiles qui ont été en contact avec des préparations contenant de la chlorhexidine.

Conditions de conservation :

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C et à l'abri de l'humidité. Ne pas congeler. A garder hors de portée des enfants.

Précautions particulières de manipulation :

Se laver les mains avant d'ouvrir le tube et après utilisation.

Conduite/Utilisation des machines :

Aucun effet connu

Durée de vie : 3 ans

NB : En cas de doute, demander l'avis du médecin OU le conseil du pharmacien.

Nom et Adresse du Fabricant :

Lomus Pharmaceutical Pvt. Ltd.

Gothatar Kathmandu Nepal

Tel: 4990496, 016226944, 016226955 Fax 4436395

e-mail: prajwalpandey@lomus.com.np, info@lomus.com.np

Nom et Adresse du Titulaire d'AMM :

Population Services International- Madagascar

Association Malgache de Marketing Social (AMMS)

Immeuble Fiaro, Escalier D, 2eme Etage, Ampelohoa

Antananarivo 101 – Madagascar

Tel (261) 20 22 629 84 – E-mail : info@psi.mg

Date de révision de la notice :

Janvier 2014