

Mortalité maternelle Philippines 2000-2020

Estimations comparables au niveau international du RMM du Groupe interorganisations pour l'estimation de la mortalité maternelle, qui comprend l'OMS, l'UNICEF, l'UNFPA, le Groupe de la Banque mondiale et la Division de la population des Nations Unies

Table 1: Estimations

Année	RMM ^{a*†}	PM ^{b*†}	Décès indirects liés au VIH [†]	Naissances vivantes ^c (milliers)	Décès maternels [†]
2000	129 [114, 145]	0.09 [0.08, 0.1]	0	2245	2897
2005	122 [109, 138]	0.08 [0.07, 0.09]	0	2334	2852
2010	105 [93, 121]	0.07 [0.06, 0.08]	0	2417	2538
2015	88 [77, 104]	0.06 [0.05, 0.07]	0	2396	2109
2020	78 [67, 96]	0.05 [0.04, 0.06]	1	2473	1935

^a Ratio de mortalité maternelle (RMM) défini comme le nombre de décès maternels pour 100 000 naissances vivantes chez les femmes en âge de procréer (15 à 49 ans).

^b Proportion des décès maternels (PM) définie comme la proportion de décès maternels toutes causes confondues chez les femmes en âge de procréer (15 à 49 ans) dus à des causes maternelles.

^c UN Population Division, Department of Economic and Social Affairs. World Population Prospects. New York; 2022.

* Les intervalles d'incertitude de toutes les estimations sont des intervalles d'incertitude de 80 % (10e et 90e centiles des distributions a posteriori). Ce choix a été fait par opposition aux intervalles plus standard de 95 % en raison des incertitudes non négligeables inhérentes aux résultats de mortalité maternelle.

† Les chiffres présentés dans le tableau sont des estimations fondées sur des données nationales, telles que des enquêtes ou des dossiers administratifs, ou d'autres sources, produites par l'organisme international lorsque les données par pays pour une ou plusieurs années ne sont pas disponibles, lorsqu'il existe plusieurs sources ou lorsque des problèmes de qualité des données se posent.

Table 2: Estimations

Période	Réduction de taux annuelle*	Évolution globale du RMM (%)*
2000, 2020	2.57 [1.34, 3.31]	40.22 [23.51, 48.37]
2010, 2020	2.95 [1.22, 4.4]	25.57 [11.51, 35.58]

* Les chiffres présentés dans le tableau sont des estimations fondées sur des données nationales, telles que des enquêtes ou des dossiers administratifs, ou d'autres sources, produites par l'organisme international lorsque les données par pays pour une ou plusieurs années ne sont pas disponibles, lorsqu'il existe plusieurs sources ou lorsque des problèmes de qualité des données se posent.

Données issues des registres et statistiques de l'état civil (RSEC)

Table 3: Données issues des registres et statistiques de l'état civil (RSEC)

Période d'étude ^a	Décès maternels ^a	Décès parmi les femmes ^b	Facteur d'ajustement des données RSEC ^{c†}	Sensibilité ^{d†}	Spécificité ^{e†}	Exhaustivité ^{f†}	Utilisabilité ^g	Décès maternels non inclus ^h
[1992, 1993)	975	23972	1.507579	0.661238	0.999758	72.44047	0.7076857	NA
[1993, 1994)	1474	24375	1.507540	0.661238	0.999758	74.52305	0.7186671	NA
[1994, 1995)	1784	24455	1.507514	0.661238	0.999758	75.30176	0.7314744	NA
[1995, 1996)	1483	24505	1.507484	0.661238	0.999758	75.00765	0.7328489	NA
[1996, 1997)	1545	25164	1.507095	0.661238	0.999758	78.31445	0.7532524	NA
[1997, 1998)	1512	25329	1.507075	0.661238	0.999758	78.99513	0.7599277	NA
[1998, 1999)	1577	26506	1.507065	0.661238	0.999758	82.16112	0.7743795	NA
[1999, 2000)	1303	25960	1.507047	0.661238	0.999758	80.00000	0.7805447	NA
[2000, 2001)	1690	27857	1.506595	0.661238	0.999758	84.55095	0.8248862	NA
[2001, 2002)	1765	29523	1.507000	0.661238	0.999758	89.01318	0.8427666	NA
[2002, 2003)	1798	29928	1.506524	0.661238	0.999758	89.55921	0.8563885	NA
[2003, 2004)	1797	30306	1.506463	0.661238	0.999758	89.97951	0.8622574	NA
[2006, 2007)	1719	33642	1.506125	0.661238	0.999758	96.01301	0.9321708	NA
[2007, 2008)	1666	33435	1.505990	0.661238	0.999758	96.40725	0.9497536	NA
[2008, 2009)	1716	34340	1.505311	0.661238	0.999758	97.51526	0.9558362	NA
[2009, 2010)	1591	35849	1.505170	0.661238	0.999758	100.00000	0.9644957	NA
[2010, 2011)	1714	35932	1.505026	0.661238	0.999758	99.46850	0.9711475	NA
[2011, 2012)	1462	36504	1.504847	0.661238	0.999758	99.04762	0.9763670	NA
[2014, 2015)	1570	37227	1.503392	0.661238	0.999758	100.00000	0.9718753	NA
[2016, 2017)	1479	39533	1.502943	0.661238	0.999758	100.00000	0.9762224	NA
[2017, 2018)	1474	39025	1.502761	0.661238	0.999758	100.00000	0.9802947	NA
[2018, 2019)	1562	39794	1.502638	0.661238	0.999758	100.00000	0.9803488	NA
[2019, 2020)	1418	40941	1.502545	0.661238	0.999758	100.00000	0.9755258	NA

^a Données sur les décès maternels obtenues à partir des systèmes RSEC définies par les codes CIM-10 O00-O95; O98-O99 Grossesse, accouchement et puerpéralité et A34 Tétanos obstétrical. Les décès maternels tardifs (O96) et les morts de séquelles relevant d'une cause obstétricale directe (O97) sont exclus aux fins de comparaison internationale. OMS. Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes Genève; 2010.

^b Female deaths 15-49 from the Civil Registration and Vital Statistics System (CRVS).

^c Facteur d'ajustement des données RSEC = facteur d'ajustement pour tenir compte de la différence entre les PM enregistrées dans le système RSEC et les PM vraies.

^d Sensibilité = proportion des décès maternels correctement classés parmi les décès maternels vrais.

^e Spécificité = proportion des décès non maternels correctement classés parmi les décès non maternels vrais.

^f Exhaustivité = pourcentage de décès enregistrés parmi les femmes en âge de procréer.

^g Utilisabilité = pourcentage de décès dont on estime qu'ils sont correctement codés; proportion d'exhaustivité*(1- proportion des décès mal codés)*100.

^h Les données ne remplissaient pas les critères d'inclusion pour les raisons suivantes : 1) un manque d'exhaustivité et d'utilisabilité ou 2) d'autres études spécialisées sont utilisées. Veuillez consulter la section suivante du profil pour plus de détails.

* Veuillez noter l'interprétation de la notation: pour une période [a, b), l'observation commence à la date a et se termine avant la date b; ainsi, la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 est indiquée comme suit: [2000,2001].

[†] Peterson E, Chou D, Moller A-B, Gemmill A, Say L, Alkema L. Estimating maternal mortality using data from national civil registration vital statistics systems: A Bayesian hierarchical bivariate random walk model to estimate sensitivity and specificity of reporting. arXiv:190908578 [stat] [Internet]. 2019 Sep 18 [cited 2021 Aug 11]; Available from: <http://arxiv.org/abs/1909.08578>.

Données exclues des systèmes RSEC

Aucune donnée exclue

Données provenant d'autres sources

Table 4: Données provenant d'autres sources

Période d'étude*	Source	Type de source	Décès maternels ^a	Décès liés à la grossesse ^b	Décès parmi les femmes, 15 à 49 ans	PM maternels ^c	PM liée à la grossesse ^{d,†}	RMM pour 100 000 naissances vivantes ^e	RMM ajusté pour 100 000 naissances vivantes	F+ ^{f†}	F- ^{g†}	U+ ^{h†}
[1986.37, 1993.37)	DHS 1993	Enquête	NA	NA	NA	NA	0.1278148	223.6997	205.7380	NA	NA	NA
[1991, 1998)	NDHS 1998	Divers	NA	NA	NA	NA	0.1121882	172.0000	158.1885	NA	NA	NA
[2000.4, 2007.4)	FPS 2006	Enquête	NA	NA	NA	NA	0.0961852	140.3419	129.0676	NA	NA	NA
[2004, 2012)	FHS 2011	Divers	NA	NA	NA	NA	0.1230000	182.4077	167.7573	NA	NA	NA

^a Décès maternels définis selon la CIM-10.

^b Décès liés à la grossesse définis selon la CIM-10.

^c La PM est calculée lorsque les décès sont définis comme décès maternels.

^d La PM liée à la grossesse est calculée lorsque les décès déclarés sont définis comme des décès liés à la grossesse.

^e Le RMM dans cette colonne est calculé à partir de proportion des décès parmi les femmes en âge de procréer dus à des causes maternelles.

^f Faux positifs : décès non maternels classés à tort comme des décès maternels.

^g Faux positifs : décès maternels classés à tort comme des décès non maternels.

^h Décès maternels non enregistrés dans les systèmes RSEC.

* Veuillez noter l'interprétation de la notation: pour une période [a, b), l'observation commence à la date a et se termine avant la date b; ainsi, la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 est indiquée comme suit: [2000,2001].

† Calculé à partir d'études qui entreprennent des analyses spécialisées de la notification systématique des décès maternels.

‡ Les données de l'enquête ont été ajustées de 1,1 pour tenir compte de la sous-notification et standardisées par âge lorsqu'elles ont été obtenues à l'aide de la « méthode des sœurs ».

Données issues d'études exclues du modèle de régression

Aucune donnée exclue

Variables explicatives utilisées dans le modèle

Table 5: Variables explicatives utilisées dans le modèle

Année	GDP ^{a*} (Par habitant, PPA)	GFR ^b (Pour 1000 femmes âgées de 15 à 49 ans)	SBA ^c (%)
2000	4436	110	60
2005	5073	110	66
2010	5908	100	75
2015	7353	90	84
2020	8423	90	88

^a WHO, MMEIG. Gross domestic product (GDP) per capita measured in purchasing power parity (PPP) equivalent dollars using 2017 as the baseline year were taken from World Bank's World Development Indicators (WDI) database, and in instances supplemented by unofficial estimates derived by MMEIG using growth rates in United Nations GDP data and/or previous MMEIG GDP estimates. Geneva; 2021.

^b General fertility rate (GFR) from UN Population Division, Department of Economic and Social Affairs. World Population Prospects. New York; 2022.

^c Skilled Birth Attendant (SBA) from WHO, UNICEF joint SBA database. Geneva; 2022. In some instances, supplemented with unofficial estimates derived by MMEIG. Annual series were estimated by fitting a multilevel time series (AR1) model with region- and country-specific intercepts and slopes.

* Sur la base d'une période mobile de 5 ans.

Estimations

(Données d'entrée) Les ajustements suivants ont été appliqués aux décès maternels en fonction du type de source:

1. Une standardisation par âge a été appliquée aux enquêtes en population ayant eu recours à la « méthode des sœurs » pour obtenir des données.
2. Un ajustement à la hausse de 10 % a été appliqué à toutes les données qui n'ont pas été obtenues à partir des systèmes RSEC ou d'études spécialisées, afin de tenir compte de la sous-notification.

(Données ajustées au modèle) Les ajustements suivants ont été appliqués aux décès maternels en fonction du type de source et de la définition des décès déclarés.

1. Les données sur les décès maternels obtenues à partir des systèmes RSEC ont été ajustées à partir du BMis.
2. Un ajustement a été appliqué aux observations des décès liés à la grossesse afin d'éliminer les décès accidentels ou fortuits (non maternels) du décompte.

